

معیار ولز (Wells) جهت تعیین ریسک ترومبوآمبولی وریدی

نمره	یافته های بالینی برای آمبولی ریوی PTE	نمره	یافته های بالینی برای DVT
+3	وجود علائم بیماری DVT	+1	جراحی ، صدمه یا گچ در اندام تحتانی ، پارزی یا پارالیزی
+3	تشخیص افتراقی دیگری که علائم بیمار را توجیه کند نداشته باشیم	+1	بستری در تخت بیش از سه روز یا جراحی بزرگ در ۴ هفته قبل
+1.5	ضربان قلب بالای ۱۰۰	+1	تندرنس در مسیرووریدهای پشت زانو یا ران
+1.5	بیحرکتی بیش از سه روز یا جراحی در چهار هفته اخیر	+1	تورم یک عضو
+1.5	سابقه قبلی از TE و DVT	+1	ادم گوده گذار در اندام مبتلا
+1	وجود خلط خونی	+1	تورم بیشتر از ۳ سانتی متر یک پا نسبت به پای دیگر در ۱۰ سانتی متری زیر زانو
+1	بدخیمی حاد یا درمان شده در طول شش ماه قبل یا درمان تسکینی	+1	تورم عروق محیطی که ناشی از واریس نباشد
		+1	داشتن سابقه DVT قبلی
		+1	بدخیمی حاد یا درمان شده که شش ماه قبل بوده است
		+3	تزریق وریدی دارو
		-1	تشخیص جایگزین با احتمال بیشتری نسبت به DVT
	جمع نمرات		جمع نمرات

امتیاز ریسک ترومبوآمبولی ریوی (PTE)		امتیاز ریسک ترومبوآمبولی وریدی (DVT)	
احتمال کم	۲ >	احتمال کم	۰-۱
احتمال متوسط	۲-۶	احتمال متوسط	۱-۲
احتمال بالا	۶ <	احتمال بالا	۳-۸

مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه - واحد ایمنی بیمار