

معیار ارزیابی هامپتی دامپتی (معیار زمین خوردن در اطفال)

معیار	مشخصات	پارامتر
۴ ۳ ۲ ۱	کمتر از ۳ سال	سن
	۲ تا ۳ سال	
	۱۳ تا ۱۴ سال	
	بالای ۱۳ سال	
۲ ۱	پسر	جنس
	دختر	
۴ ۳ ۲ ۱	تشخیص نورولوژیکی برای کودک مطرح می باشد	تشخیص
	تغییرات اکسیژناسیون واضح دارد ، یا تغییرات همودینامیک که منجر به تغییرات اکسیژناسیون میشود (تشخیصهای تنفسی ، دهیدراتاسیون ، آنمی ، بی اشتهایی ، سکوپ ، سرگیجه و ...)	
	اختلالات عصبی رفتاری	
	دیگر تشخیص ها	
۳ ۲ ۱	از محدودیتهای خودش آگاه نیست	اختلالات شناختی
	محدودیتهای خود را فراموش می کند	
	به تواناییهای خود آگاه می باشد	
۴ ۳ ۲ ۱	سابقه افتادن در نوزادی یا نوپایی از تخت دارد	فاکتورهای محیطی
	کودک بیمار از وسایل کمک حرکتی (روروک ، عصا و ...) استفاده می کند یا نوزاد و نوپا در گهواره ، مبل تختخوابشو در کنار والدین گذاشته شده است و یا در نو می باشد (در اتاقهای عمومی)	
	کودک بیمار در تخت است	
	کودک بیمار سرپایی است	
۳ ۲ ۱	در طی ۲۴ ساعت گذشته سابقه جراحی / سدیشن / بیهوشی دارد	پاسخ جراحی / سدیشن / بیهوشی
	در طی ۴۸ ساعت گذشته سابقه جراحی / سدیشن / بیهوشی دارد	
	بیشتر از ۴۸ ساعت از جراحی / سدیشن / بیهوشی گذشته است / ندارد	
۳ ۲ ۱	از چند دارو استفاده میکند (بیشتر از ۳ دارو) از دسته دارویی سداتیوها (بجز بیمارانی که در آی سی یو سدیشن دریافت میکنند) - فلج کننده ها - خواب آورها - مخدرها - باریتوراتها - فنوتیازین ها - آنتی دپرسانت ها - لاکتیوها - دیورتیک ها	استفاده از داروها
	یکی از داروهای بالا را دریافت میکند	
	داروهای دیگر استفاده میکند / دارو استفاده نمیکند	
	ریسک پایین : ۱۱-۷	جمع کل
	ریسک بالا : ۱۲ یا بالاتر	